

schülke -+



primasept® med

Płyn do mycia i higienicznej dezynfekcji skóry

Skład

100 g płynu do stosowania na skórę zawiera substancje czynne: 1-propanol 10,00 g, 2-propanol 8,00 g, 2-bifenylol 2,00 g. Substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina (roztwór 30%), kwasy tłuszczowe uwodornione, żółcień chinolinowa (E104), disodu edetynian dwuwodny, substancja zapachowa (perfumy Biancaflor), potasu wodorotlenek (roztwór 45%), hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

- dezynfekcja i mycie rąk
- dezynfekcja i mycie ciała

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, 2-bifenylol lub na którykolwiek ze składników leku.

Właściwości użytkowe

Produkt leczniczy **primasept® med** nie jest drażniącym skórę płynem dezynfekująco-myjącym. Dobór substancji myjących, dezynfekujących i pielęgnujących zapewnia w jednym procesie mycia skuteczne usunięcie zabrudzeń z powierzchni skóry oraz jej dezynfekcję nie powodując wysuszenia. Produkt działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa SV40).

Zalety

- jednoczesne mycie i higieniczna dezynfekcja
- szerokie spektrum bójcze
- dermatologicznie przebadany
- zalecany do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała pacjentów
- nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym

Postać farmaceutyczna

Płyn. Przejrzysty, żółty, lepki.

Sposób użycia

primasept® med stosowany jest bez rozcieńczenia.

Higieniczna dezynfekcja i mycie rąk:

3 ml płynu wcierać porcjami w suche dłonie przez 1 minutę, następnie zwilżyć dłonie niewielką ilością wody, wytworzyć pianę i przez kolejną 1 minutę wcierać wytworzoną pianę w dłonie. Ostatecznie spłukać dokładnie pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ręce.

Higieniczna dezynfekcja i mycie ciała:

3 ml płynu rozprowadzić porcjami na skórze o powierzchni 900 cm² (powierzchnia ta odpowiada np. powierzchni przedramienia i pozostawić na 1 minutę, następnie przy pomocy niewielkiej ilości wody wytworzyć pianę i myć skórę przez kolejną 1 minutę. Po upływie tego czasu spłukać pianę pod bieżącą wodą i wysuszyć ciało.

Właściwości farmakologiczne

Właściwości farmakodynamiczne – grupa farmakoterapeutyczna: leki dezynfekujące i antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol. Kod ATC: D 08 AE 06.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy do stosowania na skórę. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania lek może powodować reakcje alergiczne. Produkt łatwopalny.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Rodzaj i zawartość opakowania

primasept® med dostępny jest w postaci płynu w opakowaniach o zawartości: 500 ml, 1 L – butelka, 5 L – kanister.

Dane farmaceutyczne

Okres ważności: 3 lata.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

primasept® med

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

tel.: 022 568 22 02/03, fax: 022 568 22 04

schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie MZ nr 13043.