

Softasept® N

Szybko działający środek do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk, oparty na alkoholu.



Softasept® N

Szybko działający środek do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk, oparty na alkoholu.

Nazwa produktu leczniczego i substancje aktywne

Softasept N niezabarwiony/barwiony - Szybko działający środek do dezynfekcji skóry i higienicznej dezynfekcji rąk, oparty na alkoholu. W swym składzie zawiera: 74,1g etanolu (100%), 10,0g 2-propanolu, substancje dodatkowe: kwas cytrynowy, L-pomarańcz-2, L- czerwień -1 /barwiony/.

Grupa farmakologiczna

Leki dermatologiczne, pozostałe antyseptyki i środki do dezynfekcji, kod ATC: D08AX

Postać farmaceutyczna

Softasept N niezabarwiony/barwiony: roztwór na skórę, niezabarwiony przezroczysty lub zabarwiony, alkoholowy roztwór.

Opakowania

Butelki i pojemniki z polietylenu o zawartości 250ml, 1000ml i 5000ml.

Wskazania do stosowania

- Przedoperacyjna dezynfekcja skóry
- Dezynfekcja skóry przed
 - biopsjami,
 - punkcjami,
 - pobieraniem krwi,
 - zastrzykami,
 - cewnikowaniem,
 - zdejmowaniem szwów chirurgicznych,
 - zaopatrywaniem ran itp.
- Higieniczna dezynfekcja rąk

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etanol, alkohol izopropylowy, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek łatwopalny. Punkt zapłonu 12-14°C. Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.

Stosowanie produktu leczniczego

- Nierozcieńczony Softasept N niezabarwiony/barwiony nanieść na skórę, którą należy zdezynfekować i rozprowadzić jałowym wacikiem. Odkazaną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć lekiem, następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar leku zebrać wacikiem.
- Minimalny czas aplikacji w przypadku skóry ubogiej w gruczoły łojowe wynosi 15 sekund (zastrzyki, punkcje). W zabiegach typu nakłucie stawu lub kanału mózgowo-rdzeniowego minimalny czas aplikacji to 1 minuta (w razie potrzeby należy powtórzyć aplikację).

- W przypadku dezynfekcji skóry zawierającej wiele gruczołów łojowych (np. głowa, skóra powyżej mostka, skóra pomiędzy łopatkami) czas aplikacji to 2,5 minuty (aplikację należy powtarzać).
- Softasept N niezabarwiony/barwiony charakteryzuje się przedłużonym czasem działania do 24 godzin.
- Produkt leczniczy Softasept N niezabarwiony/barwiony nie wpływa negatywnie na proces gojenia się ran.
- Produkt leczniczy może być stosowany na oddziałach noworodkowych, pod nadzorem lekarza.
- Przed zastosowaniem urządzeń elektrycznych należy odczekać, aż skóra pokryta lekiem Softasept N wyschnie.

Właściwości i skuteczność produktu leczniczego

- skuteczny w stosunku do:
 - bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych w tym mycobacterium (MRSA Tbc, F)
 - wirusów (HIV, HBV, HCV, VACINIA, ROTA, POLIO)
 - grzybów
- działa w ciągu 15 sekund (MRSA), doskonały natychmiastowy i przedłużony efekt odkażający 24godz.
- nie zawiera dodatkowych substancji czynnych - nie podrażnia skóry
- nie traci aktywności w obecności białka, surowicy i krwi
- bardzo szybko schnie.
- zapewnia właściwe przyleganie folii stosowanej podczas zabiegów operacyjnych
- posiada dobre właściwości odtłuszczające
- wersja barwiona do zaznaczenia pola operacyjnego
- przebadany dermatologicznie nie powodując reakcji alergicznych
- nie ma negatywnego wpływu na gojenie się ran

Okres ważności

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu 5 lat., po pierwszym otwarciu opakowania 12 miesięcy (nie dłużej niż okres ważności podany na etykiecie)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen, Niemcy

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Świadectwo Rejestracji nr 11656/M/99
Pozwolenie nr 13041